

# Uvod v analizo podatkov v eksperimentalni fiziki osnovnih delcev

doc. dr. Marko Bračko

Univerza v Mariboru, FKKT

in



Institut Jožef Stefan




F9 – Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev

IMC2026 – Belle II, IJS, Ljubljana



17. marca 2026



# Izmerjeni signali (količine) → vizualizacija




# Izmerjeni signali (količine) → vizualizacija



- Za (ročno) pregledovanje je podatkov preprosto preveč ...
- Želimo določiti lastnosti delcev, izmeriti razne vrednosti, konstante, ...
- Potrebujemo izračunane količine, statistične metode, ...

# ... in kako snov vidimo/razumemo danes?



## Osnovni gradniki snovi :

		LEPTONS		QUARKS	
All ordinary particles belong to this group	FIRST FAMILY	<b>Electron</b> Responsible for electricity and chemical reactions; it has a charge of -1 $e$	<b>Electron neutrino</b> Particle with no electric charge, and possibly no mass; billions fly through your body every second $\nu_e$	<b>Up</b> Has an electric charge of plus two-thirds; protons contain two, neutrons contain one $u$	<b>Down</b> Has an electric charge of minus one-third; protons contain one, neutrons contain two $d$
	SECOND FAMILY	<b>Muon</b> A heavier relative of the electron; it lives for two-millionths of a second $\mu$	<b>Muon neutrino</b> Created along with muons when some particles decay $\nu_\mu$	<b>Charm</b> A heavier relative of the up; found in 1974 $c$	<b>Strange</b> A heavier relative of the down; found in 1964 $s$
	THIRD FAMILY	<b>Tau</b> Heavier still; it is extremely unstable. It was discovered in 1975 $\tau$	<b>Tau neutrino</b> not yet discovered but believed to exist $\nu_\tau$	<b>Top</b> Heavier still $t$	<b>Bottom</b> Heavier still; measuring bottom quarks is an important test of electroweak theory $b$

→ vsak delec iz tabele ima svoj anti-delec, npr.  $e^-$  in  $e^+$

→ leptoni so nesestavljeni

→ kvarki sestavljajo težje delce - hadrone, npr.


$$p = uud \quad (+2/3e_0 + 2/3e_0 - 1/3e_0)$$

{ $e_0$  je osnovni naboj:

$$n = udd \quad (+2/3e_0 - 1/3e_0 - 1/3e_0)$$

$\sim 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As}$ }

# ... in kako snov vidimo/razumemo danes?



**Nosilci osnovnih sil med gradniki :**

**gluoni (močna sila)**

**fotoni (EM sila)**

**bozoni  $W^+$ ,  $W^-$ ,  $Z^0$  (šibka sila)**

**gravitoni (gravitacija)**

**Higgsovo polje (masa delcev) :**

**Higgsov bozon**

# Barioni in mezoni: vezana stanja kvarkov in antikvarkov

## Barioni

proton: uud

nevtron: udd

$\Lambda$ : uds

masa

$1 m_p$

$\sim 1 m_p$

$1.2 m_p$

## Mezoni

$\pi^+$ : kvark u + antikvark d

$K_S$ : kvark d + antikvark s

$J/\psi$  : kvark c + antikvark c

$B^0$ : kvark d + antikvark b

masa

$1/7 m_p$

$1/2 m_p$

$3 m_p$

$5.5 m_p$

In seveda še mnogi drugi delci ...

# Kako opazujemo majhne delce?

**Kvantna mehanika:**

delci se obnašajo kot valovanje

**Max Planck**

$$E = h\nu = h (c / \lambda)$$


velika energija → velika frekvenca  
→ majhna valovna dolžina

**Posebna teorija relativnosti:**

energija in masa sta izmenljivi


**Albert Einstein**

$$E=mc^2$$




$$E=h\nu$$

$$E=mc^2$$




## Sedaj pa še nekaj enačb:

The equation  $E = mc^2$  is displayed in white serif font against a background of a blue sky with white clouds and a bright sun in the upper right corner.
$$E = mc^2$$


To je seveda samo poseben primer splošnejše enačbe...


## Sedaj pa še nekaj enačb:


$$E = mc^2$$

To je seveda samo poseben primer splošnejše enačbe...

**zato bi morali v resnici zapisati tole:**


$$E = \gamma mc^2$$


$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$
$$\gamma = 1$$
$$E = mc^2$$

ONLY CORRECT  
IF AN OBJECT IS  
NOT MOVING  
WITH RESPECT  
TO YOU

## Sedaj pa še nekaj enačb: faktor gama ( $\gamma$ )

$$\gamma = \frac{E}{mc^2}$$



$$\gamma = \frac{E \text{ (moving)}}{E \text{ (not moving)}}$$

Ta faktor se torej povečuje, ko pospešujemo delce.

Isti faktor nastopa tudi v definiciji gibalne količine:


$$p = \gamma \times m \times v$$
$$m_{\text{relativistic}} = \gamma m$$
$$p = m_{\text{relativistic}} v$$

S faktorjem  $\gamma$  lahko tudi predefiniramo maso delca.

## Prave (relativistične) enačbe :

$$E = \gamma mc^2$$

$$p = \gamma \times m \times v$$



$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

$E$  - energy

$m$  - mass

$c$  - speed of light


$p$  - momentum

Z definicijo faktorja  $\gamma$  lahko to enačbo preverite sami...

## Prave (relativistične) enačbe :

$$E = \gamma m c^2$$

$$p = \gamma \times m \times v$$



$$E^2 = (p c)^2 + (m c^2)^2$$

$E$  - energy

$m$  - mass

$c$  - speed of light

$p$  - momentum

### Dva posebna primera :

Za  $p = 0$  (delec, ki miruje) :

$$E = m c^2$$

Za  $m = 0$  (foton –  $\gamma$ ) :

$$E = p c$$

# Invariantna masa – eksperimentalna količina :

$$m c^2 = \sqrt{E^2 - p^2 c^2} \quad (1)$$

Maso delca lahko izrazimo (preverite!) iz prejšnje enačbe... in v idealnem primeru bi bila masa (1) natanko enaka masi delca

## Neidealni primer - komplikacije :

- Delci razpadajo → uporabiti moramo razpadne produkte;
- Tudi če zaznamo/izmerimo vse razpadne produkte, povsem natančne meritve niso mogoče → masa (1) je torej  $\approx$  enaka masi delca
- Ozadje (npr. podobni razpadi) → še več razlik med maso (1) in maso delca ...

## → Invariantna masa delca :

$$m c^2 = \sqrt{\left(\sum_i E_i\right)^2 - \left(\sum_i \vec{p}_i c\right)^2}$$

$$E_i = \sqrt{\left(\sum_i m_i c^2\right)^2 + \left(\sum_i \vec{p}_i c\right)^2}$$

Indeks  $i$  teče po razpadnih produktih delca!

# Primer (prave) meritve z detektorjem Belle :

## $\mathcal{B}$ Observation of $Z^+(4430)$ state

PRL 100, 142001(2008)  
657  $B\bar{B}$

$Z(4430)^+ \rightarrow \psi(2S)\pi^+$  :


Charged state that decays like charmonium (= charged charmonium-like state)

$$\text{Br}(\bar{B}^0 \rightarrow K^- Z^+(4430)) \times \text{Br}(Z^+(4430) \rightarrow \pi^+ \psi') = (4.1 \pm 1.0 \pm 1.4) \times 10^{-5}$$

Necessary ingredients:

- Histogram  $\rightarrow$  bins of  $m_{\text{invariant}}$
- Just specific decay modes are used
- Errors from measurements ...
- Background:
  - wrong part. identification
  - missing particles in reconstr.
  - wrong combinations/decay modes
  - ...

$\rightarrow$  First serious tetraquark candidate



# Primer (prave) meritve z detektorjem Belle :


## $\mathcal{B}$ Observation of $Z^+(4430)$ state

PRL 100, 142001(2008)  
657  $B\bar{B}$

$Z(4430)^+ \rightarrow \psi(2S)\pi^+$  :

Charged state that decays like charmonium (= charged charmonium-like state)

$$\text{Br}(\bar{B}^0 \rightarrow K^- Z^+(4430)) \times \text{Br}(Z^+(4430) \rightarrow \pi^+ \psi') = (4.1 \pm 1.0 \pm 1.4) \times 10^{-5}$$



➔ First serious tetraquark candidate

# Primer (prave) meritve z detektorjem Belle :

## Observation of $Z^+(4430)$ state

PRL 100, 142001(2008)  
657  $B\bar{B}$


$Z(4430)^+ \rightarrow \psi(2S)\pi^+$  :

Charged state that decays like charmonium (= charged charmonium-like state)

$$\text{Br}(\bar{B}^0 \rightarrow K^- Z^+(4430)) \times \text{Br}(Z^+(4430) \rightarrow \pi^+ \psi') = (4.1 \pm 1.0 \pm 1.4) \times 10^{-5}$$

Necessary ingredients:

- Histogram  $\rightarrow$  bins of  $m_{\text{invar}}$
- Just specific decay modes are used (statistics)
- Errors from measurements ...
- Background:
  - wrong part. identification
  - missing particles in reconstr.
  - wrong combinations/decay modes
  - ...



- Extract the parameters: fitting the data distribution with functions

# Primer komplikacij : različni razpadni načini delcev

Properties of kaons

Particle name	Particle symbol	Antiparticle symbol	Quark content	Rest mass (MeV/c <sup>2</sup> )	I <sup>G</sup>	J <sup>PC</sup>	S	C	B'	Mean lifetime (s)	Commonly decays to (>5% of decays)
Kaon <sup>[1]</sup>	K <sup>+</sup>	K <sup>-</sup>	u $\bar{s}$	493.677 ± 0.016	1/2	0 <sup>-</sup>	1	0	0	(1.2380 ± 0.0021) × 10 <sup>-8</sup>	$\mu^+ + \nu_\mu$ or $\pi^+ + \pi^0$ or $\pi^+ + \pi^+ + \pi^-$ or $\pi^0 + e^+ + \nu_e$
Kaon <sup>[2]</sup>	K <sup>0</sup>	$\bar{K}^0$	d $\bar{s}$	497.611 ± 0.013	1/2	0 <sup>-</sup>	1	0	0	[a]	[a]
K-Short <sup>[3]</sup>	K <sub>S</sub> <sup>0</sup>	Self	$\frac{d\bar{s} + s\bar{d}}{\sqrt{2}}$ [b]	497.611 ± 0.013 <sup>[c]</sup>	1/2	0 <sup>-</sup>	(*)	0	0	(8.954 ± 0.004) × 10 <sup>-11</sup>	$\pi^+ + \pi^-$ or $\pi^0 + \pi^0$
K-Long <sup>[4]</sup>	K <sub>L</sub> <sup>0</sup>	Self	$\frac{d\bar{s} - s\bar{d}}{\sqrt{2}}$ [b]	497.611 ± 0.013 <sup>[c]</sup>	1/2	0 <sup>-</sup>	(*)	0	0	(5.116 ± 0.021) × 10 <sup>-8</sup>	$\pi^\pm + e^\mp + \nu_e$ or $\pi^\pm + \mu^\mp + \nu_\mu$ or $\pi^0 + \pi^0 + \pi^0$ or $\pi^+ + \pi^0 + \pi^-$



Razpadi mezonov D:

$$D^{*+} \rightarrow D^0 \pi^+ \quad \text{in} \quad D^{*-} \rightarrow \bar{D}^0 \pi^-$$


$$\bar{D}^0 \rightarrow K^+ \pi^- \quad / \quad D^0 \rightarrow K^- \pi^+$$

# Možne izboljšave :

## Analysis tools: B-meson selection



Reconstructing B meson decays at Y(4S):  
use two variables,  
**beam-constrained mass  $M_{bc}$**   
**(energy-substituted mass  $m_{ES}$ )**  
and  
**energy difference  $\Delta E$**



$$\Delta E \equiv \sum E_i^{CMS} - E_{beam}^{CMS}$$

$$M_{bc} = \sqrt{(E_{beam}^{CMS})^2 - (\sum \vec{p}_i^{CMS})^2}$$

# Zaključek :

Sedaj ste (vsaj v grobem) pripravljeni, da tudi sami poskusite priti do rezultatov ...

**Srečno!**

